

Chipmunks



Soort naam

Tamias Striatus, Oostelijke wangzak eekhoorn of chipmunk.

Formaat


De chipmunk is een kleinere grondeekhoorn met een totale lengte van ongeveer 25 cm. En met een gewicht van 100 tot 250 gram.

Draagtijd

31 dagen.

Aantal jongen

De chipmunk krijgt gemiddeld rond de 4 tot 5 jongen.



Herkomst

De chipmunk komt voor aan de oostkant van de Verenigde Staten.

Leefgebied

De chipmunk komt vooral voor in loofbossen, ze hebben een voorkeur voor bossen met voldoende eikenbomen. Ze zijn niet heel gevoelig voor verstoring van het leefgebied. Ze leggen grote voedselvoorraden aan om de winter door te komen en gaan dan in winterrust.

Karakter

De chipmunk is een kleine eekhoorn met een groot karakter. Ze zijn zeker in de herfst en winter erg op voedsel gericht. Ze worden snel tam zeker als je eten bij je hebt. Deze eekhoorn kun je het beste alleen houden. In de natuur verdedigen ze een territorium van ongeveer 15 meter rondom het nest tegen soortgenoten. Jonge dieren kun je vaak nog wel een tijdje samen houden, maar vooral in de herfst kunnen ze erg agressief worden onderling. De vrouwtjes chipmunks beginnen in het voorjaar te fluiten om een mannetje te lokken. Dit is het moment om ze te koppelen. Kijk goed hoe de eerste introductie gaat, als er geen vechtpartijen uitbreken kun je het koppel 2/3 dagen bij elkaar laten. Daarna kun je het koppel weer scheiden zodat het vrouwtje rustig haar jongen kan grootbrengen.

Huisvesting

De chipmunk is winterhard en kunnen in een relatief kleine voliere. Het zijn goede gravers dus let hierop bij de huisvesting dat ze geen tunnels de volière uit kunnen graven. Ze gebruiken de nestkast ook om een voedselvoorraad aan te leggen, dus houd dit in de gaten. Chipmunks brengen de meeste tijd door op de grond, maar kunnen ook prima klimmen. Loopwielen worden ook gebruikt.

Voeding

De chipmunk is een zaden en noten eter. Ze zijn het hele jaar druk bezig met hun voedselvoorraad, dus voer niet teveel. Chipmunks hebben wel een aanleg om dik te worden. Een goed zaadmengsel vormt de basis van de voeding. Zoals een mengsel van eekhoorn voer met een algemeen knaagdier voer. (4 om 3) Daarnaast is het goed om een extra eiwit bron bij te voeren. Dit kan in de vorm van een babymelkpoeder mengsel, eivoer of universeel voer voor vogels, of in de vorm van levende of gedroogde insecten.